

# Hermelijn



De Hermelijn komt voor in gebied van de Wbe Susteren/Graetheide . De waarnemingen zijn echter zeldzaam omdat zij vaak verwisselt worden met de wezel in de zomer.

Beide geslachten zien er hetzelfde uit, maar het mannetje is 50% groter dan het wijfje. Nieuwsgierig als hij is, maakt de hermelijn, net zoals de wezel, dikwijls een 'kegel' om de omgeving te onderzoeken. De scherpe, rechtlijnige grens tussen de roomwitte onderkant en de bruine flanken is dan goed te zien. De lange bruine staart met de zwarte pluimpunt is kenmerkend (vergelijk met de wezel wiens staart korter is en geen zwarte eindpunt heeft). Deze eindpunt blijft ook in het winterkleed zwart. De hermelijn heeft bij ons 's winters een witte vacht. De verharing begint in november en verloopt zeer snel. In andere gematigde streken is de vacht 's winters nog gedeeltelijk bruin en in het zuiden blijft hij bruin.

## Data:

- **Lichaamslengte:** 22-29cm
- **Staartlengte:** 5-12cm
- **Gewicht:** 150-400gr.

De hermelijn leeft in een hol, meestal een oud mollenverblijf of konijnenhol. Waar een wezel met gemak een muizenhol kan binnendringen lukt dit de hermelijn niet en moet minimaal een

doorsnee van 5 centimeter hebben. De hermelijn leeft solitair en zijn territorium loot uiteen van 5 tot 40 hectare afhankelijk van het voedselaanbod. Net als bij andere marterachtigen is het territorium van de mannetjes veel groter en overlapt dit van verschillende vrouwtjes. Hermelijnen zijn fanatieke jagers, die zowel overdag en 's-nachts jagen.

## **Biotoop**

Open plekken in bossen, akkers, duinen en vaak in de omgeving van water. Hij komt in allerlei terreinen voor, maar vooral op plaatsen met veel dekking. Duingebieden vormen voor hermelijnen goede jachtterreinen vanwege de vele konijnen, die ze tot in hun pijpen achtervolgen.

## **Voedsel**

Dag en nacht is de lenige, stoutmoedige hermelijn actief. Hij kan tot onze felste roofdieren worden gerekend. Onvermoeibaar achtervolgt hij zijn prooi, waarbij hij vooral op zijn reuk afgaat. De prooien worden gedood door een nekbeet. Ze kunnen heel goed zwemmen en schromen ook niet om hun prooien in het water te achtervolgen. Een hermelijn eet per dag gemiddeld zo'n 25% van zijn lichaamsgewicht, wat neerkomt op zo'n 2 tot 3 muizen. Woelratten zit hij ook in het water nog na. Het fabeltje dat hij een bloedzuiger zou zijn, dankt hij aan zijn gewoonte het bloed van de vacht van zijn slachtoffer te likken. Zijn prooi bestaat hoofdzakelijk uit kleine knaagdieren, spitsmuizen, vogels en de eieren van laatstgenoemde maar ook uit ratten en jonge konijnen. Prooien – die vaak tweemaal zo groot zijn als de hermelijn zelf – worden gedood door een beet diep in de nek. Net als de wezel bewaart de hermelijn soms gedode en half opgegeten prooidieren.

Een rennende hermelijn behaalt een snelheid van dertig kilometer per uur, waarbij hij sprongen maakt van 50 cm. in

nood kan de hermelijn blazen als een kat, zijn grootste predators zijn de vos, kat en havik, maar in nood zijn ze heel moedig om zich te verdedigen.

## **Territorium**

Het jachtterrein beslaat een twintigtal hectare. Onder normale omstandigheden leeft de hermelijn solitair en bewoont een oud mollennest, konijnenhol of rotsspleet.

## **Voortplanting**

In de voortplantingstijd ziet men beide geslachten soms kort tezamen. De paring vindt in februari – maart plaats en net als bij het ree kent de hermelijn na de bevruchting een verlengde draagtijd. Na acht – tien maanden begint de actieve draagtijd die slechts tien weken duurt en een worp bestaat uit vier tot acht jongen. Deze worden na 3 maanden zelfstandig en zoeken dan hun eigen territorium. De jongen worden in april-mei geboren: jaarlijks is er één worp van drie à negen jongen. Jagen en spelen vindt dikwijls in gezinsverband plaats. De jonge hermelijnen zijn na circa tien weken zelfstandig. Ze kunnen dan voor wezels worden aanzien, maar onderscheiden zich hiervan door de typische staart. Het is vaak al winter, voordat het gezin uiteen valt.

## **Aantallen**

De hermelijn is nog steeds wijdverbreid en vrij algemeen. De hermelijn komt in grote delen van Europa voor, behalve in het zuiden. In Nederland komt de soort verspreid over het hele land voor, maar niet op Vlieland en Ameland.

De hermelijnen stand heeft veel te lijden van de predatie door de vos, maar van het gebruik van muizen – en rattenvergif in de landbouw

Alleen de waarnemingen worden vermeld in de jaarlijkse

trendtellingen en rapportages van de Wildbeheereenheid  
Susteren